• 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
• 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사 · 약사와 상담하시기 바랍니다.

일반의약품

큐립연고

CuLip Ointment

【원료약품의 분량】 1 그램 중

유효성분 : 토코페롤아세테이트(KP) ..... 2 밀리그램
에녹솔론(EP) ..... 3 밀리그램
피리독신염산염(KP) ..... 1 밀리그램
알란토인(USP) ..... 5 밀리그램
염화세틸피리디늄수화물(USP) ..... 1 밀리그램
첨가제(보존제) : 메틸파라벤 1.53밀리그램, 프로필파라벤 0.35밀리그램
기타첨가제 : 경질유동파라핀, 백색바셀린, 부틸레이티드히드록시톨루엔, 소르비탄모노스테아레이트, 스테아릴알코올, 이소프로필팔미테이트, 조합향료(프레쉬로즈향71113), 조합향료(허브향119202), 폴리소르베이트80, 폴리옥실40경피마자유

【성 상】
백색의 특이한 향이 있는 반투명한 연고제

【효능 · 효과】
입술 갈라짐, 입술 짓무름, 입술염(구순염), 입술꼬리염(구각염)

【용법 · 용량】
1일 수회(여러 차례) 적당량을 질환 부위에 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 환자
3) 습윤(습기 참)이나 미란(짓무름)이 심한 환자

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
1) 이 약의 사용으로 피부에 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우
2) 5~6일 동안 사용하여도 증상이 개선되지 않는 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
1) 입술에 국소에만 사용한다.
2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용한다.
3) 눈에 들어가지 않게 주의한다. 만일, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻는다. 또한 증상이 심한 경우에는 안과의사의 진료를 받는다.
4) 이 약은 벤조산(나트륨)을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.

4. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 가능한 습기가 적고 서늘한 장소에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다. 또한, 사용기한 내라도 개봉 후에는 가능한 한 빨리 사용한다.

→ 뒷면계속

【저장방법】 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관
【포장단위】 8 그램/튜브
【제조자】 동화약품(주),충청북도 충주시 충주산단1로 167
【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금 부담)

2404

※ 사용전에 설명서를 반드시 주의 깊게 읽고, 설명서를 제품과 함께 보관하십시오.
※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주십시오.
※ 의약품 부작용 신고 피해구제 상담:1644-6223, 의약품 피해구제 상담:14-3330
※ 본 의약품은 KGMP품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
※ 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 동화약품(주) 홈페이지(www.dong-wha.co.kr)또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)을 참조해주시기 바랍니다.
※ 이 첨부문서 작성일자(2024.04.19) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.
※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 약사 및 소비자상담실: 080-023-1897 (수신자 요금 부담)로 문의하시기 바랍니다.

동화약품
SINCE 1897